

# テルビナフィン錠125mg「NP」

## 服薬ガイド

テルビナフィン錠125mg「NP」は、カビの一種でおこる皮膚の病気で、皮膚の深いところや爪にできるもの、あるいは、ひどい水虫やタムシなどを治療するお薬です。



(実物大)

正しく治療を続けて  
いただくために  
必ずお読み下さい



# このお薬を飲みはじめる前に 主治医に「必ず伝えて欲しい」こと

- 以前にお薬を飲んで発しんなどがでたことのある方
- 肝臓の悪い方
- 血液の病気がある方
- 妊娠または授乳中の方
- 他のお薬(薬局で買った薬も含む)を服用もしくは使用されている方、また、途中で他の薬を服用もしくは使用される方

## お薬の飲み方

### ● 飲み方

必ず指示に従い、シートから取り出して  
コップ1杯の水またはぬるま湯といっしょに  
飲んで下さい。


### ● 飲み忘れた場合

できるだけ早く1回分を  
飲んで下さい。

**絶対に2回分を1度に  
飲まないで下さい。**

### ● あやまって多く飲んだ場合

すぐに主治医または薬剤師に  
相談して下さい。



## お薬を飲みはじめてから

# こんな症状はありませんか？

お薬を飲みはじめてから以下の症状があらわれたら、副作用の可能性があります。  
必ず主治医にご相談下さい。

### ●カゼのような症状

体がひどくだるい、高い熱が出る、のどが痛い  
首やわきのリンパ腺のはれ



### ●皮膚や眼球の症状

目や皮膚が黄色い、皮膚が赤くなる、発しん  
薬を飲みはじめてから特に皮膚がかゆい  
皮下出血（皮膚に紫色の斑点が出る）



### ●消化器（お腹や胃）の症状

下痢、腹痛、胃がむかむかする、  
強い吐き気がする、吐く、



### ●脱力感や筋肉痛など

手足の力がはいらぬ、筋肉が痛い  
尿の色が濃い

### ●頭痛やめまいなど

頭痛、めまい、眠気、ふらつき



### ●味覚がおかしい

食べ物の味が苦くなる  
味がわからない



# 検査目

テルビナフィン錠125mg「NP」により少数ですが肝臓や血液に影響

が出るのが予想されます。肝臓や血液に異常がないか早期に発見するため、薬を飲む前と飲み始めの2ヶ月間は月に1回の検査を受けるために来院しましょう。

投与前

年

月

日

1ヶ月後

年

月

日

2ヶ月後

年

月

日

ヶ月後

年

月

日

ヶ月後

年

月

日

ヶ月後

年

月

日

ヶ月後

年

月

日

病医院名・薬局名



ニプロファーマ

2007年3月作成 (YK)  
テルビナ (001)