

抗精神病剤

リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg「NP」
細粒1%「NP」

「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」

適応追加承認取得のご案内

2020年8月

ニプロ株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、抗精神病剤『リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg、細粒1%「NP」』につきまして、2020年8月26日付で、「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」の適応追加の承認を取得しましたので、ご案内申し上げます。

今後も、本剤の適正使用に注力をするとともに、統合失調症、小児期の自閉スペクトラム症に対する治療の発展に貢献できるよう努めて参る所存ですので、今後ともなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

【承認内容】

効能・効果	リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg、細粒1%「NP」 統合失調症 <u>小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性</u> リスペリドン錠3mg「NP」 統合失調症
用法・用量	統合失調症 通常、成人にはリスペリドンとして1回1mg1日2回より開始し、徐々に増量する。 維持量は通常1日2～6mgを原則として1日2回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。但し、1日量は12mgを超えないこと。 <u>小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性</u> <u>体重15kg以上20kg未満の患者：</u> <u>通常、リスペリドンとして1日1回0.25mgより開始し、4日目より1日0.5mgを1日2回に分けて経口投与する。症状により適宜増減するが、増量する場合は1週間以上の間隔をあけて1日量として0.25mgずつ増量する。但し、1日量は1mgを超えないこと。</u> <u>体重20kg以上の患者：</u> <u>通常、リスペリドンとして1日1回0.5mgより開始し、4日目より1日1mgを1日2回に分けて経口投与する。症状により適宜増減するが、増量する場合は1週間以上の間隔をあけて1日量として0.5mgずつ増量する。但し、1日量は、体重20kg以上45kg未満の場合は2.5mg、45kg以上の場合は3mgを超えないこと。</u>

下線 部：適応追加部分



製品に関するお問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室

0120-226-898

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)