

● 開封の方法

下の図の青色の部分をひっぱり、
矢印の方向に
切り取ってください。



● 保存上の注意

- 開封前後ともに光と湿気を避けて
室温(1~30°C)で保管してください。
- 開封後4週間経過した場合は、
残りの点眼液を使わないでください。

注意事項

- 1) このお薬は、1回1滴、1日1回の点眼液です。
1日1回を超えて使用しないでください。
- 2) 開封前後ともに光と湿気を避けて室温(1~30°C)
で保管してください。
- 3) 開封後4週間経過した場合は、残った点眼液を使
用しないでください。
- 4) このお薬を使用した場合、人によっては瞳の色が
濃くなることがあります。
- 5) 点眼後、一時的に目がかすむことがありますので、
症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の
運転は行わないでください。
- 6) 点眼後に何か異常を感じた時は、すぐに主治医ま
たは薬剤師に相談してください。

医院名・病院名

NIPRO

ラタノプロスト点眼液 0.005%「TOA」を 使用される方へ

監修

聖マリアンナ医科大学
眼科学特任教授
上野聰樹先生



緑内障・高眼圧症の治療剤です。
1回1滴、1日1回点眼してください。

点眼方法

1 点眼前には、手をきれいに洗ってください。



2 1回1滴、1日1回点眼してください。



- 点眼液に細菌などが入るのを防ぐため、点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

- 点眼し忘れた日があっても、翌日に2回点眼したり、1回に2滴点眼することは必要ありません。

3 点眼後は目を軽く閉じて、3分程度、目がしらの下を指で押させてください。



- 他の点眼液を使用するときは、5分以上の間隔をあけて点眼してください。

- コンタクトレンズを変色させることがあるのでは、コンタクトレンズを装用している場合は、点眼前にレンズを外し、15分以上経過後に再装用してください。

点眼後の注意

点眼後、目からあふれた点眼液をそのままにしておくと、目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなったりすることがありますので、すぐに濡らしたティッシュやタオルでふきとるか、目を閉じて洗顔してください。



日常生活では、お化粧を落とす前やお風呂に入る前に点眼するのも、タイミングの良い方法です。