

# メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」

# メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」

## 適正使用のお願い

### —飲酒について—

製造販売 ニプロ株式会社

メトホルミン塩酸塩を服用中に、飲酒により重篤な乳酸アシドーシスが発現した事例が報告されています。

過度の飲酒により、肝臓における乳酸の代謝が低下し、乳酸が蓄積しやすくなります。また、脱水状態となり、乳酸アシドーシス発現のリスクが高くなります。

乳酸アシドーシスの発現、重症化を予防するために、患者及びその家族の方へ下記の点についてご指導いただきますようお願い致します。

- お酒を飲みすぎないでください。
- 肝臓が悪い患者さんは禁酒してください。
- 大量にお酒を飲んだときには、メトホルミン塩酸塩の服用を一時的にやめてください。

なお、「過度のアルコール摂取者」への、メトホルミン塩酸塩の投与は禁忌です。  
アルコールの適量には個人差があり、「過度のアルコール」の基準はありません。  
飲酒の機会が増える時期には特に、患者及びその家族へのご指導をお願い致します。

乳酸アシドーシスの発現を避けるための注意点を記載した患者向け指導箋や、投与時チェックシートをご用意しておりますので、ご活用いただきますようお願い致します。

- 患者向け指導箋  
「メトホルミン塩酸塩錠250mgMT・500mgMT「ニプロ」を服用される患者さんへ」
- 医療関係者向け資材  
「投与時のチェックシート」

本剤の使用にあたっては、添付文書をよくご確認下さい。