

外用殺菌消毒剤
イソプロパノール
消毒液 70%「ニプロ」



GS1<調査包装単位用コード>
01149874900522

キャップ
ボトル
ラベル

C-1

2019年6月作成(第1版)

日本標準商品分類番号 872615
承認番号 30100AMX00039
薬価収載 2019年12月
販売開始 1992年 7月

貯法：密栓し、室温保存 火気を避けて保存

包装変更品

500mL

外用殺菌消毒剤
イソプロパノール
消毒液 70%「ニプロ」

第4類 アルコール類 水溶性 危険等級II 火気厳禁

禁 忌(次の場合には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜【損傷皮膚及び粘膜への使用
により、刺激作用を有する。】

【組成・性状】

有効成分	日本薬局方 イソプロパノール 70vol%
性状	無色透明の液で、特異なにおいがある

※GS1コードは左側面に表示しています。

製造番号

使用期限

 **NIPRO**
製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

外用殺菌消毒剤
イソプロパノール
消毒液 70%「ニプロ」

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

通常、本剤をそのまま用いる。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- 2広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2.副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度 不明
過敏症注)	発疹等	
皮膚注)	刺激症状	

注) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4.適用上の注意

- 投与経路
外用にのみ使用すること。
- 使用時

(1)同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

外用殺菌消毒剤
イソプロパノール
消毒液 70%「ニプロ」

(2)本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

(3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

(4)本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。

【薬効薬理】

本剤は微生物の蛋白質を変性凝固させて殺菌作用を示す。

本剤は芽胞産生菌(*C.tetani*、*C.welchii*、*B.anthraxis*等)及び一部のウイルスには無効であるといわれる。

【取扱い上の注意】

1.キャップを取るときは、液が飛び出さないように容器の肩部を持ち、キャップを開封すること。

2.安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験[室温(1~30°C)、3年間]の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、本剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

【製品情報お問い合わせ先】

ニプロ株式会社 医薬品情報室
〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
TEL 0120-226-898 FAX 06-6375-0177

A1-1