

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」

適正使用のお願い

—脱水について—

製造販売 ニプロ株式会社

脱水状態でメトホルミン塩酸塩服用を継続し、重篤な乳酸アシドーシスが発現した事例が報告されています。

脱水状態では乳酸が蓄積しやすくなりますので、乳酸アシドーシスの発現、重症化を予防するためには、患者及びその家族の方へ下記の点についてご説明ください。

- 適度に水分をとるよう心がけてください。
- 発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良のときには脱水を起こすことがありますので、メトホルミン塩酸塩を飲むのをいったんやめて、医師または薬剤師に相談してください。
- 飲酒によっても脱水を引き起こすことがありますので、お酒を飲みすぎないでください。

利尿作用のある薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に脱水にご注意ください。なお、脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行ってください。

乳酸アシドーシスの発現を避けるための注意点を記載した患者向け指導箇や、投与時チェックシートをご用意しておりますので、ご活用いただきますようお願い致します。

・患者向け指導箇

「メトホルミン塩酸塩錠250mgMT・500mgMT「ニプロ」を服用される患者さんへ」

・医療関係者向け資材

「投与時のチェックシート」

本剤の使用にあたっては、添付文書をよくご確認下さい。

専用アプリ「添文ナビ®」でGS1バーコードを読み取ると、最新の電子添文を閲覧可能です。

