

外用殺菌消毒剤

イソプロ消毒液50%「NP」

(50%イソプロパノール液)

[GSI] <調剤包装単位用コード>
0104987190601902

[GSI] <販売包装単位用コード>
0104987190054910
[JAN]
987190054913



製造番号及び使用期限は容器の肩部に表示しています。

A1-1

2014年2月作成(第1版)

日本標準商品分類番号 872615
承認番号 22000AMX02294
薬価収載 2008年12月
販売開始 1992年 7月

貯法：密栓し、室温保存 火気を避けて保存

500mL

外用殺菌消毒剤

イソプロ消毒液50%「NP」

(50%イソプロパノール液)

禁 忌 (次の場合には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】

有 效 成 分	日本薬局方 イソプロパノール	50vol%
性 状	無色透明の液で、特異なにおいがある	

外用殺菌消毒剤

イソプロ消毒液50%「NP」

(50%イソプロパノール液)

【效能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

通常、本剤をそのまま用いる。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1)眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2.副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類＼頻度	頻 度 不 明
過 敏 症注)	発疹等
皮 膚注)	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4.適用上の注意

- 1)投与経路
外用にのみ使用すること。
2)使用時
(1)同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

外用殺菌消毒剤

イソプロ消毒液50%「NP」

(50%イソプロパノール液)

(2)本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

(3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

(4)本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。

【薬効薬理】

本剤は微生物の蛋白質を変性凝固させて殺菌作用を示す。本剤は芽胞產生菌(*C.tetani*, *C.welchii*, *B.anthracis*等)及び一部のウイルスには無効であるといわれる。

【取扱い上の注意】

1.キャップを取るときは、液が飛び出さないように容器の肩部を持ち、キャップを開封すること。

2.安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験[室温(1~30°C)、3年間]の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、本剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

【製品情報お問い合わせ先】

ニプロ株式会社 医薬品情報室
〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
TEL 0120-226-898 FAX 06-6375-0177



製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号