

クエチアピン錠25mg・100mg・200mg「ヨシトミ」 を服用する患者さんにご家族の方へ

25mg錠



実物大



80% 縮小

100mg錠



実物大



80% 縮小

200mg錠



実物大



80% 縮小

服用する前に
確認するべき事

- ☐ 糖尿病の方
- ☐ 糖尿病といわれたことのある方

このお薬は服用して
いただけません。

- ☐ ご親族に糖尿病になった方がいる方
- ☐ 血糖値が高い方
- ☐ 肥満傾向の方
- ☐ 体重が増加してきた方

糖尿病になりやすい方
ですので、服用される前に
必ず医師もしくは薬剤師に、
相談してください。

服用中に気をつけること

- ◎血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。
- ◎血糖値の変化をみるため、定期的に血糖値の測定を
行う場合があります。

- ☐ 激しいのどの渇き
- ☐ 水・お茶・清涼飲料水などを
たくさん飲む
- ☐ おしっこの量が多くなる
- ☐ 何回もトイレに行く

このような症状に
気づいたときは、
すぐに医師または
薬剤師に連絡して
ください。


● このお薬の飲み方

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が
決めます。コップ1杯程度の水またはぬるま湯で
飲んでください。



● 飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気が
付いた時に、1回分を飲んでください。ただし、
次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の
時間に1回分を飲んでください。



● このお薬を飲んだ後に自動車の運転など危険を 伴う機械の操作はしないでください。



● このお薬を服用中は、飲酒は控えてください。



● 妊婦または妊娠している可能性のある方は医師 に相談してください。また、このお薬を服用中 は授乳を避けてください。



● 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他の お薬を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでい ることを医師または薬剤師に伝えてください。



● その他、気になることがありましたら、医師また は薬剤師に相談してください。

