

－適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

処方箋医薬品^{注)}

メサラジン錠250mg「NP」

メサラジン錠500mg「NP」

MESALAZINE TABLETS

2015 年 7 月

ニプロ株式会社

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を**自主改訂**により下記のとおり改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、添付文書の各項を十分ご覧くださいますようお願い申し上げます。

＜改訂のポイント＞

その他の副作用：「胸部痛、頸部痛」を追記

記

改訂後(____下線：追加記載)	改訂前								
4. 副作用 2) その他の副作用 <table><tr><th>種類\頻度</th><th>頻度不明</th></tr><tr><td>その他</td><td>発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい、<u>胸部痛、頸部痛</u></td></tr></table>	種類\頻度	頻度不明	その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい、 <u>胸部痛、頸部痛</u>	4. 副作用 2) その他の副作用 <table><tr><th>種類\頻度</th><th>頻度不明</th></tr><tr><td>その他</td><td>発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい</td></tr></table>	種類\頻度	頻度不明	その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい
種類\頻度	頻度不明								
その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい、 <u>胸部痛、頸部痛</u>								
種類\頻度	頻度不明								
その他	発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、浮腫、筋肉痛、CK上昇、ループス様症候群、むくみ、末梢神経障害、めまい								

【改訂の理由】

企業報告に基づき、「その他」の項に「胸部痛、頸部痛」を追記致しました。

以上

今後とも当社製品のご使用にあたって副作用等の有害事象をご経験の際には、当社MRまで、できるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

◎DSU(医薬品安全対策情報) No.241掲載(平成27年7月発行予定)

◎流通の関係上、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに日数を要することもございますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

◎改訂後の添付文書情報は当社ホームページ(<http://www.nipro.co.jp/>)に掲載しています。また医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)にも掲載されます。