

オランザピンOD錠2.5mg「TCK」 を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬を安全に服用していただくための大切なお知らせですので、必ずお読みください。

オランザピン
OD 2.5

オランザピン

TCK

実物大

オランザピンOD錠2.5mg(TCK)

オランザピン オランザピン

OD

2.5mg 2.5mg

オランザピン オランザピン

OD

TCK

2.5mg 2.5mg

オランザピン

OD

OD 2.5

2.5mg

オランザピン オランザピン

TCK

OD

TCK

2.5mg 2.5mg

Olanzapine OD 2.5mg (TCK)

オランザピンOD錠2.5mg(TCK)



オランザピン オランザピン

OD 2.5

OD 2.5



オランザピン

OD 2.5

ここにお薬は
ありません



オランザピン

OD 2.5



オランザピン

OD 2.5

OD 2.5

90% 縮小

このお薬の飲み方

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

このお薬は水なしで飲むことができます。舌の上で唾液を含ませ
軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。

寝たままの状態では水なしで飲まないでください。なお、普通
のお薬と同じように、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。



服用する前に確認すべきこと

- 糖尿病の方
- 糖尿病といわれたことのある方
- ご親族に糖尿病になった方がいる方
- 血糖値（血液中のブドウ糖量）が高い方
- 肥満傾向の方
- 体重が増加してきた方

このお薬は服用していただけません。

糖尿病になりやすい方ですので、服用される前に必ず医師もしくは薬剤師に、相談ください。

服用中に気をつけること

- ◎血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。
- ◎血糖値の変化を見るため、定期的に血糖値の測定を行う場合があります。

- 激しいのどの渴き
- 水・お茶・清涼飲料水などをたくさん飲む
- おしっこの量が多くなる
- 何回もトイレに行く

このような症状に気づいたときは、医師に連絡し、診察を受けてください。

※糖を含む飲料水（ジュース、炭酸飲料、スポーツドリンクなど）を急にたくさん飲むと、血糖値が急激に上昇する可能性がありますので、激しいのどの渴きがある場合には、糖分を含む飲料水を飲むのをやめて、すぐに医師に連絡してください。

- 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。
- その他、気になることがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。



医療機関名