


# オランザピンOD錠2.5mg「TCK」 を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬を安全に服用していただくための大切な  
お知らせですので、必ずお読みください。



## このお薬の飲み方

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。  
このお薬は水なしで飲むことができます。舌の上で唾液を含ませ  
軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。  
寝たままの状態では水なしで飲まないでください。なお、普通  
のお薬と同じように、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

## 飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでく  
ださい。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分  
を飲んでください。



服用する前に  
確認すべきこと

- 糖尿病の方
- 糖尿病といわれたことのある方

- ご親族に糖尿病になった方がいる方
- 血糖値（血液中のブドウ糖量）が高い方
- 肥満傾向の方
- 体重が増加してきた方

このお薬は服用して  
いただけません。

糖尿病になりやすい方  
ですので、服用される前  
に必ず医師もしくは薬剤  
師に、相談ください。

服用中に気をつけること

- ◎血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。
- ◎血糖値の変化をみるため、定期的に血糖値の測定を行う場合があります。

- 激しいのどの渇き
- 水・お茶・清涼飲料水などを  
たくさん飲む
- おしっこの量が多くなる
- 何回もトイレに行く

このような症状に  
気づいたときは、医師に  
連絡し、診察を受けて  
ください。

※糖を含む飲料水（ジュース、炭酸飲料、スポーツドリンクなど）を急に  
たくさん飲むと、血糖値が急激に上昇する可能性がありますので、**激し  
いのどの渇きがある場合には、糖分を含む飲料水を飲むのをやめて、す  
ぐに医師に連絡してください。**

- 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬  
を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医  
師または薬剤師に伝えてください。
- その他、気になることがありましたら、医師または薬剤  
師に相談してください。



医療機関名