

—適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

2016年12月

ニプロ株式会社

抗血小板剤

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

クロピドグレル錠 25mg・75mg 「ニプロ」

CLOPIDOGREL TABLETS

「効能・効果」「用法・用量」変更のご案内

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品『クロピドグレル錠 25mg・75mg「ニプロ」』につきまして、このたび2016年12月21日付けで下記のとおり「効能・効果」「用法・用量」の一部変更が承認されましたので、お知らせ申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

新（_____下線：追加）	旧
<p>【効能・効果】</p> <p>○虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制</p> <p>○経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患</p> <p>急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞）</p> <p>安定狭心症、陳旧性心筋梗塞</p> <p>○末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制</p>	<p>【効能・効果】</p> <p>○虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制</p> <p>○経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患</p> <p>急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞）</p> <p>安定狭心症、陳旧性心筋梗塞</p>

新（_____下線：追加）	旧
<p style="text-align: center;">【用法・用量】</p> <p>○虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制の場合 通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。</p> <p>○経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患の場合 通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして300mgを1日1回経口投与し、その後、維持量として1日1回75mgを経口投与する。</p> <p>○<u>末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制の場合</u> <u>通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与する。</u></p>	<p style="text-align: center;">【用法・用量】</p> <p>○虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制の場合 通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。</p> <p>○経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患の場合 通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして300mgを1日1回経口投与し、その後、維持量として1日1回75mgを経口投与する。</p>

以上

【医薬品情報お問い合わせ先】ニプロ株式会社 医薬品情報室 TEL 0120-226-898 FAX 06-6375-0177