

アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」を服用する患者さまへ

●このお薬の特徴

- ・このお薬は、異常な心臓の興奮を鎮めて、乱れた心臓の鼓動（不整脈）を規則的にするはたらきがあります。
- ・このお薬は、体調がよくなったからと自己判断で飲むのをやめたり量を減らしたりせず、主治医の指示どおり飲み続けましょう。



●服用前にご確認ください

該当する項目のある方は、担当の医師・薬剤師にその旨をお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、かゆみ、発疹などのアレルギー症状がでたことがある
- 現在、他にお薬を服用している
- 洞不全症候群、房室ブロックがある
- 妊娠または授乳をしている
- 現在、他の病院にかかっている

●服用時の注意点

このお薬は、次のお薬と一緒に飲むことはできません。

リトナビル・サキナビル・サキナビルメシル酸塩・インジナビル硫酸塩エタノール付加物・ネルフィナビルメシル酸塩・スパルフロキサシン・モキシフロキサシン塩酸塩・バルデナフィル塩酸塩水和物・シルデナフィルクエン酸塩・トレミフェンクエン酸塩・テラプレビル・フィンゴリモド塩酸塩・エリグルスタット酒石酸塩

■このお薬の服薬中は、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品は摂取しないように注意してください。

●これらの症状に注意しましょう

これらの症状があらわれた場合、副作用の初期症状である可能性があります。すぐに服用をやめ、医師の診療を受けてください。

息切れ
息苦しさ
咳



胸苦しさ
動悸



全身がだるい
食欲がない
皮膚や白目が
黄色くなる



のどの痛み
熱が出る
(38度以上)
さむけ



主治医の指示に従って定期的に脈拍、血圧
心電図検査、心エコー検査等を行なってください。