

# リバスチグミンテープ「ニプロ」を使用される方と介護者の方へ

医師の指示に従って、正しくお使いください。

## 【注意事項】

- この説明書は大切に保管してください。
- このお薬は処方された患者さん以外はお使いにならないようお願い致します。

このお薬は有効成分を皮膚から吸収させるようにしたテープ剤で、もの忘れや判断力の低下などの症状の進行を遅らせる働きがあります。作用は24時間持続します。


## 使用回数・種類について

- このお薬は1日1回1枚ずつ24時間ごとに貼りかえてください。
- このお薬は4種類の大きさがあり、使い方はいずれも同じです。  
面積が大きくなるほどお薬の量(4.5mg、9mg、13.5mg、18mg)が多くなっています。

## リバスチグミンテープ「ニプロ」

※テープ表面にはボールペンなどで日付を記入できます。

実物大



お薬の量 4.5mg

包装(袋)の色 桃色

9mg

だいだい色

13.5mg

黄緑色


18mg

紫色


## 貼る場所

- このお薬は右の図で示した背中、上腕または胸のいずれか1ヵ所に貼ってください。
- 正常で健康な皮膚で、清潔で乾燥した場所、体毛がない場所、密着した衣服を着用してもこすれにくい場所に貼ってください。
- 傷口や皮膚がただれている場所には貼らないでください。
- オイル、ローション、パウダー、クリームが塗られていない場所、テープが良く貼れる場所に貼ってください。

背中：



上腕と胸：



テープを貼る場所

## 貼るときの注意

- 同じ場所に続けて貼ると、赤くなる、かゆみ、かぶれなどが生じることがありますので、前回とは異なる場所(離れた場所)に貼ってください。
- 一度に2枚以上を貼らないでください。
- 貼りかえる際には、まず前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼ってください。
- お薬は毎日ほぼ同じ時間に貼りかえてください。
- このお薬は切って使うことはできません。
- お風呂あがりに貼る場合には、十分に水分を拭き取り、お肌が乾いてから貼ってください。

## 貼り方

※包装(袋)に記載されている使用期限内にお使いください。

あらかじめ貼る場所を乾いたタオルなどで十分に拭いて、きれいにしてください。

(4.5mg、9mg、13.5mg、18mgのテープがありますが、使い方はいずれも同じです。)

- ① 使用直前に袋を開封し、お薬(テープ)を取り出す



袋の中のテープを傷つけないように、袋を手またはハサミで切り、テープを取り出してください。

- ② 茶色のシートの片方をはがす



- ③ お薬を貼る



- ④ お薬を押さえる




テープを山折りにし、茶色のシートの片方をはがします。この時、テープを左右に強く引っぱらないようにしてください。また、テープの接着面に触れないように、はがしてください。

接着面を背中、上腕部、胸のいずれかにあて、もう片方のシートを持ってテープを貼り、軽く押さえ、残りのシートをずらしながら、テープを貼っていきます。

テープがしっかりとくっつくまで手のひらで押させてください。

## 使い終わったお薬の捨て方

- テープの端を押さえてゆっくりと優しく皮膚から完全にはがしてください。
- はがしたテープは、まだお薬の成分が残っているので接着面を内側にして半分に折り込んでください。必ず、子供の手や目の届かないところに廃棄してください。
- テープをはがした後は、手を目に触れずに、石けんを使って洗ってください。



## 保管上の注意

- このお薬は1枚ごとに包装されています。ご使用になるまでは袋は開けず、高温を避けて保管してください。
- 子供の手や目の届かないところに保管してください。

## その他の注意

- 貼り忘れに気付いた時は、その時に貼ってください。翌日からは、いつもと同じ時間に貼りかえてください。貼りかえていないことに気付いた場合でも、一度に2回分を貼らないでください。
- 貼ったお薬がはがれた時は、その時点で新しいお薬に貼りかえ、翌日からは、いつもと同じ時間に貼りかえてください。はがれたお薬は、上記「使い終わったお薬の捨て方」に従い、安全に廃棄してください。
- 4日間以上貼っていない期間がある場合は、お薬の量を減らすことがありますので、お薬を貼る前に主治医に相談してください。
- このお薬を開始した時、または增量した時にめまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転など、危険をともなう機械の操作はしないでください。
- 主な副作用として、お薬を貼った場所の皮膚症状(赤くなる、かゆみなど)、嘔吐(おうと)、吐き気などが報告されています。
- このお薬を使用して体調不良などを感じることがあれば、主治医や薬剤師にご相談ください。
- 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。