

ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム 2.5 μ g「ニプロ」をお飲みになる方へ

このお薬は、かゆみを改善するお薬です。

口腔内崩壊フィルム (ODフィルム) について



“ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5 μ g「ニプロ」”は
長方形のごく薄いフィルム状のお薬です。




← このお薬の原寸大写真です。
サイズ(14mm×20mm)



お薬の取り出し方

- ① ミシン目にそって切り離してください。
- ② かわいた手指で、袋の上部を両側に広げるようにゆっくり開き、白色のフィルム状のお薬を取り出してください。

- * 水に溶けやすいので、濡れた手で取り出さないでください。
- * お飲みになる直前に取り出してください。



お薬の飲み方

● 水なしでも服用可能なお薬です。

フィルム状のお薬を舌の上にのせ、
唾液で溶かして飲み込みます。



- * 飲みにくいときは、水またはぬるま湯で飲んでください（寝たままの状態では、水なしで服用しないでください）。
- * 上あごなどに張り付くことがありますが、そのまま口の中で溶かして飲み込んでください。
- * このお薬は、口の中では吸収されません。必ず飲み込んでください。

1日1回夕食後、または夜寝る前に飲んでください。

**このお薬を飲んでから血液透析開始までは
十分な時間をあけてください。**

わからないことや気になることがあれば、医師または薬剤師におたずねください。