

シロドシン錠 2mg・4mg「ニプロ」 を服用される患者さまへ



PTPシート(縮小 70%)、錠剤(実物大)

このお薬について

シロドシン錠「ニプロ」は、尿道内部の圧力を下げ、「前立腺肥大症に伴う排尿障害」を改善するお薬です。



このお薬を飲むときの注意点

このお薬には、以下の副作用が起こることが知られています。


- ✓ 射精時の精液量が少なくなる
- ✓ 立ち上がったときにふらついたり、目まいがする
(高い場所での作業や自動車の運転などの危険を伴う作業に従事される方は、主治医にご相談ください。)
- ✓ 下痢になったり、便が軟らかくなる
- ✓ 口の中が渇く
- ✓ 鼻がつまる



気になる症状が現れた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の注意事項

- 飲み忘れた場合は、その回の服用は避けて、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
- まれに下記のような症状が現れる可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。
 - ✓ 血圧が下がる、気を失う、意識がなくなる
 - ✓ 全身がだるい、食欲がない、皮膚や白目が黄色くなる
- 白内障など、眼科の手術を受ける予定がある場合には、眼科の先生にこのお薬を服用していることをお伝えください。



施設名