

プレガバリンOD錠「ニプロ」

を服用される患者さんへ

プレガバリン OD 錠 25mg・75mg・150mg「ニプロ」



錠剤(実物大)



PTP シート(縮小 70%)

水なしで飲んだときに苦みを感じる場合は、
水で服用することをお勧めします。

- ▶ このお薬は、神経の痛みを和らげるお薬です。
- ▶ 体が痛むときだけお薬を飲むのではなく、指示された通りに服用してください。
- ▶ 効き目があらわれるまでに、消炎鎮痛剤などの一般的な痛み止めよりも時間がかかることがあります。
- ▶ 服用を開始した後は、様子をみながらお薬の量を徐々に増やしていきます。
- ▶ 痛みが軽減してきたら、主治医と相談してお薬の量を減らしたり、やめたりすることも可能です。

お薬の量や飲み方などについては、ご自身で判断せず、
必ず主治医や薬剤師の指示に従ってください。

このお薬を飲むときの注意点

- ▶ このお薬を飲むことで、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合はご相談ください。
 - 特に高齢の方では転倒の危険があるので、ご注意ください。
 - 服用中は自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ▶ 人によっては体重が増えることがあります。気になる徴候があらわれた場合はご相談ください。
- ▶ 物が重なって見える、ピントが合わず見えにくいなどの症状があらわれた場合はご相談ください。
- ▶ 次の方は、必ず主治医にお伝えください。
 - 腎臓が悪い方
 - 透析を受けている方
 - 心臓が悪い方
 - 妊娠中または授乳中の方
 - 過去に血管浮腫のあった方
 - 他のお薬（市販薬も含む）を飲んでいる方
- ▶ アルコールを飲むと、このお薬の作用を強めることがあります。
- ▶ 誤ってお薬を多く飲んでしまった場合はご相談ください。
- ▶ ご自身の判断で服用をやめたり、飲む量や飲む回数を変更したりせず必ず主治医と相談しながら治療を進めてください。
- ▶ 服用を急にやめると、不眠、悪心、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。



疑問に思うことや不安なことがある場合は、
主治医または薬剤師にご相談ください。

施設名