

リバストグミンテープ「ニプロ」を使用される方と介護者の方へ

このお薬は、先発医薬品と「有効成分」「有効成分の量」「效能・効果」「用法・用量」が同じ後発医薬品です。
剥がれにくさを考慮して角を丸くした四角形のテープ剤です。

お薬の種類

このお薬は4種類の大きさがあり、使い方はいずれも同じです。

お薬の量	4.5mg	9mg	13.5mg	18mg
薬袋の色	桃色	だいだい色	黄緑色	紫色



(製剤、葉袋：縮小)

お薬の貼り方

前回貼ったテープがある場合には、まず剥がしてください。
あらかじめ貼る場所を乾いたタオルなどで十分に拭いて、きれいにしてください。

- ① 使用直前に袋を開封し、
お薬(テープ)を取り出す



袋の中のテープを傷つけないように、袋を手またはハサミで切り、テープを取り出してください。

- ② 茶色のシートの片方をはがす

①ここから切る
②テープを取り出す



テープを山折りにし、茶色のシートの片方をはがします。この時、テープを左右に強く引っぱらないようにしてください。また、テープの接着面に触れないように、はがしてください。

- ③ お薬を貼る



接着面を背中、上腕部、胸のいずれかにあて、もう片方のシートを持ってテープを貼り、軽く押さえ、残りのシートをずらしながら、テープを貼っていきます。

- ④ お薬を押さえる







テープがしっかりとくっつくまで手のひらで押させてください。





お薬を貼るときの注意

- このお薬は下の図で示した背中、上腕または胸のいずれか1カ所に貼ってください。前回と異なる場所(離れた場所)に貼ってください。

背中



上腕と胸



テープを貼る場所

- 傷口や皮膚がただれています。貼らないでください。
- 一度に2枚以上を貼らないでください。
- 貼りかえる際には、まず前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼ってください。
- お薬は毎日ほぼ同じ時間に貼りかえてください。
- このお薬は切って使うことはできません。
- お風呂あがりに貼る場合には、十分に水分を拭き取り、お肌が乾いてから貼ってください。
- オイル、ローション、パウダー、クリームが塗られていない場所、テープが良く貼れる場所に貼ってください。
- 貼ったとき、テープ表面の透明部分から皮膚の状態(赤みなど)が見えます。貼付中または剥がした後に皮膚症状がみられた場合には、ご自身の判断でお薬を剥がしたり、中止せずに主治医または薬剤師にご相談ください。

お薬貼りかえ記録表

- お薬を貼った日を記入しましょう。

- 貼りかえた場所の番号(①~⑧)を記入しましょう。(※2)

- 前回のテープをはがしたことを確認し、空欄にチェックを入れましょう。(※1)

- お薬を貼りかえた時間を記入しましょう。

日付	曜日	前回のテープをはがした※1	何番に貼りかえた※2	貼りかえた時間
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時

日付	曜日	前回のテープをはがした※1	何番に貼りかえた※2	貼りかえた時間
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時
/			番	午前・午後 時

気になる症状があらわれた場合には、主治医または薬剤師にご相談ください。