

ソリフェナシンコハク酸塩 OD錠「ニプロ」

を服用される患者さんへ

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」



ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」



PTPシート(縮小70%)、錠剤(実物大)

このお薬について

ソリフェナシンコハク酸塩 OD錠「ニプロ」は、膀胱の筋肉が勝手に縮むのを防ぎ、膀胱の緊張をゆるめることで「過活動膀胱における症状」を改善するお薬です。



このお薬を飲むときの注意点

このお薬には、以下の副作用が起こることが知られています。

- ☑ 口の中が乾く ☑ 便秘
- ☑ 尿が出にくい、尿が出なくなる
- ☑ 目のかすみ、めまいがする

(高い場所での作業や自動車の運転などの危険を伴う作業に従事される方は、主治医にご相談ください。)



気になる症状が現れた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

その他の注意事項

- 飲み忘れた場合は、その回の服用は避けて、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
- 噛み砕かず、そのまま飲んでください。
- 「水なし」でも「水あり」でも飲むことができます。ただし、身体を起こした姿勢で飲んでください。
- 乳幼児・小児の手の届かないところで、直射日光・高温・湿気を避けて保管してください。



施設名