

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

デュロキセチンOD錠20mg/30mg「ニプロ」

デュロキセチンカプセル20mg/30mg「ニプロ」

「慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛」

適応追加承認取得のご案内

2021年6月

ニプロ株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤『デュロキセチンOD錠20mg/30mg「ニプロ」』及び『同カプセル20mg/30mg「ニプロ」』につきまして、2021年6月16日付で、「慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛」の適応追加の承認を取得致しましたので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

【承認内容】

	追加承認取得後	追加承認取得前
効能・効果	<ul style="list-style-type: none">○うつ病・うつ状態○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症 <u>慢性腰痛症</u> <u>変形性関節症</u>	<ul style="list-style-type: none">○うつ病・うつ状態○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症
用法・用量	<p>〈うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛〉 現行のとおり</p> <p>〈<u>線維筋痛症に伴う疼痛、慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛</u>〉 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。 投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。</p>	<p>〈うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛〉 現行のとおり</p> <p>〈線維筋痛症に伴う疼痛〉 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。 投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。</p>

下線 _____ 部：適応追加部分