

改訂後（ <u> </u> 下線：追加記載） ：記載位置変更）	改訂前（ ：記載位置変更）
<p>その他 倦怠感、口渇、脱力感、<u>発汗、発熱、体重増加、体重減少、胸痛、咳嗽、過換気、鼻漏、鼻出血、多飲、顔面浮腫、嚥下性肺炎、低体温、CK (CPK)上昇、トリグリセリド上昇、血中コレステロール上昇、血中インスリン上昇、血中リン脂質増加、血糖上昇、BUN上昇、BUN減少、血中総蛋白減少、血中カリウム上昇、血中カリウム減少、血中ナトリウム減少、尿中蛋白陽性、尿中ウロビリן陽性、尿糖陽性、尿潜血陽性、浮腫、<u>水中毒、脱毛、糖尿病、血糖低下、上気道感染、鼻咽頭炎、四肢痛</u></u></p>	<p>その他 倦怠感、口渇、脱力感、<u>浮腫、水中毒、脱毛、糖尿病、血糖低下、上気道感染、鼻出血、鼻咽頭炎、四肢痛、<u>発汗、発熱、体重増加、体重減少、胸痛、咳嗽、多飲、顔面浮腫、嚥下性肺炎、低体温、CK (CPK)上昇、トリグリセリド上昇、血中コレステロール上昇、血中インスリン上昇、血中リン脂質増加、血糖上昇、BUN上昇、BUN減少、血中総蛋白減少、血中カリウム上昇、血中カリウム減少、血中ナトリウム減少、尿中蛋白陽性、尿中ウロビリן陽性、尿糖陽性</u></u></p>

【改訂の理由】

○「その他の副作用」の項

企業報告に基づき、その他の項に「過換気」、「鼻漏」、「尿潜血陽性」を追記致しました。また、副作用の記載位置を一部変更致しました。

以上

今後とも当社製品のご使用にあたって副作用等の有害事象をご経験の際には、当社MRまで、できるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

<p>◎DSU (医薬品安全対策情報) No.299掲載 (令和3年6月発行予定) ◎流通の関係上、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに日数を要することもございますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。 ◎改訂後の添付文書情報は当社ホームページ(https://www.nipro.co.jp/)に掲載しています。また医薬品医療機器総合機構ホームページ(http://www.pmda.go.jp/)にも掲載されます。</p>
