

アトルバスタチン錠「NP」

を服用される患者さんへ



このお薬について

アトルバスタチン錠「NP」は、余分なコレステロールの合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、副作用としてごくまれに「横紋筋融解症^{おうもんきんゆうかいしやう}」が起こることが知られています。

服用しはじめてから次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症^{おうもんきんゆうかいしやう}の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医又は薬剤師にご相談ください。

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足の力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い（赤褐色になる）など

副作用はどのお薬でもありますが、早期に発見し適切な処置を行うことが大切です。

また、ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じられましたら、主治医又は薬剤師にご相談ください。

「横紋筋融解症」とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し、尿が出にくくなる）になることもあります。

注意事項

- ❗ このお薬は、副作用として「劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸」が起こることがあります。吐き気がする、全身がだるい、皮膚や白目が黄色くなる等の症状がみられましたら、主治医又は薬剤師に相談してください。
- ❗ グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなる場合がありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- ❗ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ❗ 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ❗ 医師の指示なしに、ご自分の判断で飲むのを止めないでください。
- ❗ 乳幼児・小児の手の届かないところで、直射日光・高温・湿気を避けて保管してください。



施設名