

β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン

タゾピペ®配合静注用 2.25 「ニプロ」

タゾピペ®配合静注用 4.5 「ニプロ」

タゾピペ®配合点滴静注用バッグ 2.25 「ニプロ」

タゾピペ®配合点滴静注用バッグ 4.5 「ニプロ」

TAZOPIPE® FOR COMBINATION INTRAVENOUS, I. V. INFUSION

「用法・用量」変更のご案内

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品『タゾピペ®配合静注用 2.25・4.5 「ニプロ」』及び『タゾピペ®配合点滴静注用バッグ 2.25・4.5 「ニプロ」』につきまして、このたび2019年11月27日付けで下記のとおり「用法・用量」の一部変更が承認されましたので、お知らせ申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

新（_____下線：追加）	旧
<p style="text-align: center;">【用法・用量】</p> <p>○タゾピペ配合静注用 2.25 「ニプロ」、タゾピペ配合静注用 4.5 「ニプロ」</p> <p>1. 一般感染症 現行のとおり</p> <p>2. 発熱性好中球減少症 通常、成人にはタゾバクタム・ピペラシリンとして、1回 4.5g（力価）を1日4回点滴静注する。なお、必要に応じて、緩徐に静脈内注射することもできる。 <u>通常、小児には1回 90mg（力価）/kg を1日4回点滴静注する。なお、必要に応じて、緩徐に静脈内注射することもできる。ただし、1回投与量の上限は成人における1回 4.5g（力価）を超えないものとする。</u></p>	<p style="text-align: center;">【用法・用量】</p> <p>○タゾピペ配合静注用 2.25 「ニプロ」、タゾピペ配合静注用 4.5 「ニプロ」</p> <p>1. 一般感染症 略</p> <p>2. 発熱性好中球減少症 通常、成人にはタゾバクタム・ピペラシリンとして、1回 4.5g（力価）を1日4回点滴静注する。なお、必要に応じて、緩徐に静脈内注射することもできる。</p>

<p>○タゾピペ配合点滴静注用バッグ 2.25「ニプロ」、タゾピペ配合点滴静注用バッグ 4.5「ニプロ」</p> <p>1. 一般感染症 現行のとおり</p> <p>2. 発熱性好中球減少症 通常、成人にはタゾバクタム・ピペラシリンとして、1回 4.5g (力価) を1日4回点滴静注する。 <u>通常、小児には1回 90mg (力価) /kg を1日4回点滴静注する。ただし、1回投与量の上限は成人における1回 4.5g (力価) を超えないものとする。</u></p>	<p>○タゾピペ配合点滴静注用バッグ 2.25「ニプロ」、タゾピペ配合点滴静注用バッグ 4.5「ニプロ」</p> <p>1. 一般感染症 略</p> <p>2. 発熱性好中球減少症 通常、成人にはタゾバクタム・ピペラシリンとして、1回 4.5g (力価) を1日4回点滴静注する。</p>
---	--

以上

【医薬品情報お問い合わせ先】ニプロ株式会社 医薬品情報室 TEL 0120-226-898 FAX 06-6375-0177