

使用法説明書改訂のご案内

ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、標題製品の変更品の出荷につきまして既にご連絡させて頂いておりますが、このたびは下線部の変更ロットが確定しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

個装箱に同封しております、使用法説明書を以下のとおり改訂します。(赤枠部を追記し、配置・順番を調整しました。)

変更前	変更後
<p>お薬の取り出し方</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ミシン目によって1回分を切り離してください。 ○かわいた手指で、袋の上部を両側に広げるように開き、白色のフィルム状のお薬を取り出してください。 <p>飲み方</p> <ul style="list-style-type: none"> ○フィルム状のお薬を舌の上のせ、唾液で溶かして飲み込みます。 ○上あごなどに張り付くことがあります。そのまま口の中で溶かして飲み込んでください。 ○飲みにくいときは、水またはぬるま湯で飲んでください(薬のままの状態では、水なしで服用しないでください)。 ○このお薬は、口中では吸収されません。必ず飲み込んでください。 <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ○もし飲み忘れたら <ul style="list-style-type: none"> ・夕食後の服用を指示されている場合、飲み忘れに気が付いたのがその日の就寝前ならば1回分を飲んでください。 ・それ以外の場合は1回分をとり、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。また、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ○血液透析を受ける際は、このお薬を飲んでから十分な時間をあけてください。 ○医師の指示なしに服用をやめないでください。 ○次の症状に気付いたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> ●全身がだるい ●食欲がない ●皮膚や白目が黄色くなる ○腹痛、めまいなどがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事しないでください。 ○グレープフルーツジュースはこの薬の作用を強めることがありますので、同時に服用しないようにしてください。 <p>保存方法・その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 ○乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。 ○わからないことや気になることがあれば、医師または薬剤師におたずねください。 <p>ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」をお飲みになる方へ</p> <p>このお薬は、かゆみを改善するお薬です。 お薬の量や飲み方は医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。</p> <p>施設名</p> <p>「ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」」は長方形のごく薄いフィルム状のお薬です。</p> <p>このお薬の原寸大写真です。サイズ(14mm×20mm)</p>	<p>お薬の取り出し方</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ミシン目によって1回分を切り離してください。 ○かわいた手指で、袋の上部を両側に広げるように開き、白色のフィルム状のお薬を取り出してください。 <p>飲み方</p> <ul style="list-style-type: none"> ○フィルム状のお薬を舌の上のせ、唾液で溶かして飲み込みます。 ○上あごなどに張り付くことがあります。そのまま口の中で溶かして飲み込んでください。 ○飲みにくいときは、水またはぬるま湯で飲んでください(薬のままの状態では、水なしで服用しないでください)。 ○このお薬は、口中では吸収されません。必ず飲み込んでください。 <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ○もし飲み忘れたら <ul style="list-style-type: none"> ・夕食後の服用を指示されている場合、飲み忘れに気が付いたのがその日の就寝前ならば1回分を飲んでください。 ・それ以外の場合は1回分をとり、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。また、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ○血液透析を受ける際は、このお薬を飲んでから十分な時間をあけてください。 ○医師の指示なしに服用をやめないでください。 ○次の症状に気付いたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> ●全身がだるい ●食欲がない ●皮膚や白目が黄色くなる ○腹痛、めまいなどがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事しないでください。 ○グレープフルーツジュースはこの薬の作用を強めることがありますので、同時に服用しないようにしてください。 <p>注意事項(続き)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○次の症状に気付いたら、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 <ul style="list-style-type: none"> ●全身がだるい ●食欲がない ●皮膚や白目が黄色くなる ○次の症状に気付いたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> ●嘔吐 ●頻尿 ●夜間頻尿 <p>保存方法・その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 ○乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。 ○わからないことや気になることがあれば、医師または薬剤師におたずねください。 <p>ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」をお飲みになる方へ</p> <p>このお薬は、かゆみを改善するお薬です。 お薬の量や飲み方は医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。</p> <p>施設名</p> <p>「ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」」は長方形のごく薄いフィルム状のお薬です。</p> <p>このお薬の原寸大写真です。サイズ(14mm×20mm)</p>

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」	14枚	03850	190-03850-0	23K011(2026/5)	2023年11月下旬
	140枚	03851	190-03851-7	未定	未定

※変更ロットが未定のものにつきましては、確定次第、弊社ホームページ『医療関係者の皆さまへ/医薬品情報サイト』(<https://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals>)の「医薬品に関するお知らせ」にてご案内します。

【医薬品情報お問い合わせ先】ニプロ株式会社 医薬品情報室 ☎ 0120-226-898 FAX.050-3535-8939

以上