

\*2024年5月改訂（第2版）  
2023年11月改訂（第1版）

日本標準商品分類番号  
876164

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 21800AMX10361000  
販売開始 2010年3月

抗酸菌症治療薬  
日本薬局方 リファンピシンカプセル  
**リファンピシンカプセル 150mg「サンド」**  
**Rifampicin Capsules**

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

**2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）**

2.1 胆道閉塞又は重篤な肝機能障害のある患者[9.3.1 参照]

\* 2.2 ルラシドン塩酸塩、タダラフィル（アドシルカ）、マシテンタン、ペマフィブラー、チカゲロル、ロルラチニブ、ボリコナゾール、イサブコナゾニウム硫酸塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩、リルピビリン塩酸塩・テノホビル アラフェナミドフル酸塩・エムトリシタビン、ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩、ドラビリン、カボテグラビル、カボテグラビルナトリウム、レナカバビルナトリウム、ソホスブビル、レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル、ソホスブビル・ベルパタスビル、グレカプレビル水和物・ピブレンタスピル、テノホビル アラフェナミドフル酸塩、ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩、アメナメビル、ニルマトレルビル・リトナビル、エンシトレルビル フマル酸、アルテメテル・ルメファントリン又はプラジカンテルを投与中の患者[10.1 参照]

2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

**3. 組成・性状**

**3.1 組成**

販売名	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」
有効成分	1カプセル中 日局リファンピシン 150mg（力価）
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロース、デンブングリコール酸ナトリウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム カプセル本体にゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、赤色3号、黄色5号、酸化チタン含有

**3.2 製剤の性状**

販売名	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」
剤形	硬カプセル剤（3号）
色調	キャップ：赤色不透明 ボディ：だいだい色不透明 内容物：橙赤色の結晶性粉末
外形	
質量	180mg（内容物）
識別コード	RFP

**4. 効能又は効果**

**〈適応菌種〉**

本剤に感性のマイコバクテリウム属

**〈適応症〉**

肺結核及びその他の結核症、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症を含む非結核性抗酸菌症、ハンセン病

**6. 用法及び用量**

**〈肺結核及びその他の結核症〉**

通常成人には、リファンピシンとして1回450mg（力価）を1日1回毎日経口投与する。ただし、感性併用剤のある場合は週2日投与でもよい。原則として朝食前空腹時投与とし、年齢、症状により適宜増減する。また、他の抗結核剤との併用が望ましい。

**〈MAC症を含む非結核性抗酸菌症〉**

通常成人には、リファンピシンとして1回450mg（力価）を1日1回毎日経口投与する。原則として朝食前空腹時投与とし、年齢、症状、体重により適宜増減するが、1日最大量は600mg（力価）を超えない。

**〈ハンセン病〉**

通常成人には、リファンピシンとして1回600mg（力価）を1ヵ月に1~2回または1回450mg（力価）を1日1回毎日経口投与する。原則として朝食前空腹時投与とし、年齢、症状により適宜増減する。また、他の抗ハンセン病剤と併用すること。

**7. 用法及び用量に関する注意**

**〈MAC症を含む非結核性抗酸菌症〉**

投与開始時期、投与期間、併用薬等について国内外の各種学会ガイドライン<sup>1)-3)</sup>等、最新の情報を参考にし、投与すること。

**8. 重要な基本的注意**

**〈効能共通〉**

8.1 重篤な肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行うこと。[10.2、11.1.1 参照]

8.2 間歇投与又は投与を一時中止し再投与する場合には、アレルギー性の副作用（ショック、アナフィラキシー、腎不全、間質性腎炎、溶血性貧血）があらわれやすい。

**〈肺結核及びその他の結核症〉**

8.3 耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

8.4 本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めることがある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続の可否を判断すること。

**〈ハンセン病〉**

8.5 「ハンセン病診断・治療指針」（厚生省・（財）藤楓協会発行）を参考に治療を行うことが望ましい。

8.6 本剤による治療についての科学的データの蓄積が少ないと含め、患者に十分な説明を行い、インフォームド・コンセントを得ること。

**9. 特定の背景を有する患者に関する注意**

**9.1 合併症・既往歴等のある患者**

9.1.1 過敏症の既往歴のある患者（ただし、本剤に対し過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと）

**9.1.2 副腎皮質不全のある患者**

副腎（急性）クリーゼを誘発することがある。

### 9.1.3 慢性甲状腺炎のある患者

甲状腺機能低下症を増悪又は顕在化させることがある。

### 9.3 肝機能障害患者

#### 9.3.1 胆道閉塞又は重篤な肝機能障害のある患者

投与しないこと。症状が悪化するおそれがある。[2.1 参照]

#### 9.3.2 肝機能障害又はその既往歴のある患者（重篤な肝機能障害のある患者を除く）

症状が悪化又は再発するおそれがある。

### 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望ましい。動物実験（ラット、マウス）で催奇形作用が報告されている。

### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト乳汁中へ移行することが報告されている。

### 9.8 高齢者

減量するなど慎重に投与すること。一般に生理機能が低下していることが多い。

## 10. 相互作用

本剤はチトクローム P450 3A4 (CYP3A4) をはじめとする肝薬物代謝酵素、UDP-グルクロン酸転移酵素 (UGT)、P 糖蛋白を誘導する作用がある。また、トランスポーター (OATP1B1、OATP1B3) を阻害する作用がある。本剤は多くの薬剤との相互作用が報告されているが、可能性のあるすべての組み合わせについて検討されているわけではないので、他剤と併用する場合には注意すること。

#### \* 10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
精神神経用剤 ルラシドン塩酸塩 ラツーダ [2.2 参照]	ルラシドン塩酸塩の作用が減弱するおそれがある。	本剤の CYP3A4 誘導作用により、ルラシドン塩酸塩の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
循環器官用薬 タダラフィル アドシリカ [2.2 参照]	タダラフィルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 誘導作用により、本剤 (600mg/日) の併用で、タダラフィル (10mg) の Cmax 及び AUC をそれぞれ 46% 及び 88% 低下させると考えられている。
循環器官用薬 マシテンタン オブスマット [2.2 参照]	マシテンタンの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 誘導作用により、マシテンタンの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
高脂血症用剤 ペマフィブラーート バルモディア [2.2 参照]	ペマフィブラーートの血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤がトランスポーター (OATP1B1 及び OATP1B3) を阻害すると考えられている。
血液・体液用剤 チカグレロル ブリリンタ [2.2 参照]	チカグレロルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 誘導作用により、チカグレロルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗悪性腫瘍剤 ロルラチニブ ローブレナ [2.2 参照]	ALT 及び AST が上昇するおそれがある。	機序は不明である。
抗真菌剤 ポリコナゾール ブイフェンド [2.2 参照]	ポリコナゾールの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 誘導作用により、ポリコナゾールの Cmax 及び AUC をそれぞれ 93% 及び 96% 低下させると考えられている。
抗真菌剤 イサブコナゾニウム硫酸塩 クレセンバ [2.2 参照]	イサブコナゾニウム硫酸塩の作用が減弱するおそれがある。	本剤の CYP3A 誘導作用により、イサブコナゾニウム硫酸塩の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 ホスアンプレナビルカルシウム水和物 レクシザ アタザナビル硫酸塩 レイタッツ [2.2 参照]	これらの薬剤の作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 誘導作用により、これらの薬剤又は活性代謝物の代謝を促進し、血中濃度を 1/5 以下に低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 リルビビリン塩酸塩 エジュラント [2.2 参照]	これらの薬剤の作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 誘導作用により、リルビビリン塩酸塩の代謝を促進し、Cmin、Cmax 及び AUC <sub>24</sub> をそれぞれ 89%、69% 及び 80% 低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 リルビビリン塩酸塩・テノホビルアラフェナミド アラフェナミドフマル酸塩・エムトリシタピン オデフシイ [2.2 参照]	リルビビリン及びテノホビルアラフェナミドの作用が減弱するおそれがある。	本剤の CYP3A 誘導作用により、リルビビリンの代謝が促進し、血中濃度を低下させると考えられている。また、P 糖蛋白誘導作用により、テノホビルアラフェナミドの血中濃度を低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 ドルテグラビルナトリウム・リルビビリン塩酸塩 ジアルカ [2.2 参照]	ドルテグラビル及びリルビビリンの作用が減弱するおそれがある。	本剤の CYP3A4 及び UGT1A1 誘導作用により、ドルテグラビルの代謝が促進し、血中濃度を低下させると考えられている。また、CYP3A4 誘導作用によりリルビビリンの代謝が促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
* 抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 エルビテグラビル、コビシスタッフ及びテノホビルの作用が減弱するおそれがある。 [2.2 参照]	エルビテグラビル、コビシスタッフ及びテノホビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4 等) 誘導作用により、エルビテグラビル及びコビシスタッフの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。また、本剤の P 糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 ドラビリン ジフェルトロ [2.2 参照]	ドラビリンの作用が減弱するおそれがある。	本剤の CYP3A4 誘導作用により、ドラビリンの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 カボテグラビル カボテグラビルナトリウム ポカブリア [2.2 参照]	カボテグラビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の UGT1A1 誘導作用により、カボテグラビルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
* 抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 レナカバビル レナカバビルナトリウム シェンレンカ [2.2 参照]	レナカバビルの作用が減弱し、耐性が発現するおそれがある。	本剤の CYP3A、P 糖蛋白及び UGT1A1 誘導作用により、レナカバビルの血中濃度を低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 ソホスブビル ソバルディ [2.2 参照]	ソホスブビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の P 糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 レジパスビル アセトント付加物・ソホスブビル ハーボニー [2.2 参照]	レジパスビル アセトント付加物及びソホスブビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の P 糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
* 抗ウイルス剤 ソホスブビル・ベルバタスピビル エブクルーサ [2.2 参照]	ソホスブビル及びベルバタスピビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の CYP 及び P 糖蛋白誘導作用により、ソホスブビル及びベルバタスピビルの血中濃度を低下させると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗ウイルス剤 グレカブレビル水和物・ピブレンタスピル マザイレット [2.2 参照]	グレカブレビル水和物及びピブレンタスピルの作用が減弱するおそれがある。	本剤のP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 テノホビル アラフエナミドフル酸塩 ベムリディ [2.2 参照]	テノホビル アラフエナミドフル酸塩の作用が減弱するおそれがある。	本剤のP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 ビクテグラビルナト リウム・エムトリシタ ビン・テノホビル ア ラフエナミドフル 酸塩 ビクタルビ [2.2 参照]	ビクテグラビルの血漿中濃度が低下するため、効果が減弱し、耐性が発現する可能性があることから、併用しないこと。また、テノホビルアラフエナミドの血漿中濃度も低下する可能性がある。	本剤のCYP3A、UGT1A1及びP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 アメナメビル アメナリーフ [2.2 参照]	アメナメビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4)誘導作用により、アメナメビルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 ニルマトレルビル・リ トナビル パキロビッド [2.2 参照]	ニルマトレルビル及びリトナビルの作用の減弱や耐性出現のおそれがある。	本剤のCYP3A誘導作用により、ニルマトレルビル及びリトナビルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 エンシトレルビル フル酸 ゾコバ [2.2 参照]	エンシトレルビル フ マル酸の作用が減弱するおそれがある。	本剤のCYP3A誘導作用により、エンシトレルビル フマル酸の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗原虫剤 アルテメテル・ルメフ アントリン リアメット [2.2 参照]	アルテメテル及びルメファントリンの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4)誘導作用により、アルテメテル及びルメファントリンの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
駆虫剤 プラジカンテル ビルトリシド [2.2 参照]	プラジカンテルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4)誘導作用により、プラジカンテルの代謝を促進し、血中濃度を約100%低下させると考えられている。

## 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系 薬剤 ジアゼパム ミダゾラム トリアゾラム等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
催眠鎮静剤、抗不安剤 不眠症治療薬 ゾルビデム酒石 酸塩 ゾピクロン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗てんかん剤 フェニトイン カルバマゼピン等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗てんかん剤 ラモトリギン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤のUGT誘導作用によるものと考えられている。
解熱鎮痛消炎剤 アセトアミノフェン	本剤の長期投与により、肝薬物代謝酵素が誘導され、肝障害を生じやすくなるとの報告がある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用により、アセトアミノフェンの代謝を促進し、肝毒性を有する代謝物の産生を増加させると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
解熱鎮痛消炎剤 ブブレノルフィン塩 酸塩	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、ブブレノルフィン塩酸塩の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗パーキンソン剤 イストラデフィリン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
精神神経用剤 ハロペリドール プロムペリドール オランザピン クエチアピンフル 酸塩 クロザピン ノルトリップチリン塩 酸塩 ミルタザピン等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩 スポレキサント	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
鎮けい剤 チザニジン塩酸塩	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
強心剤 ジギタリス製剤	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)及びP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
不整脈用剤 キニジン硫酸塩水 和物 メキシレチン塩酸塩 ジソピラミド プロパフェノン塩 酸塩 ビルシカイニド塩酸 塩水和物 $\beta$ 遮断剤 メトプロロール酒 石酸塩 プロプラノロール 塩酸塩等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
利尿剤 トルバブタン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
血圧降下剤 ブナゾシン塩酸塩 エプレレノン カルベジロール アゼルニジピン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
血圧降下剤 エナラブリルマレイ ン酸塩	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	機序は不明である。
血管収縮剤 エレトリプタン臭化 水素酸塩	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
血管拡張剤 カルシウム拮抗薬 ペラバミル塩酸塩 ニフェジピン等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
高脂血症用剤 クロフィブリート フルバスタチンナト リウム CYP3A4で代謝され る薬剤 シンバスタチン等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
高脂血症用剤 ビタバスタチンカルシウム	外国人健康成人を対象に行なった併用試験において、ビタバスタチンのCmax及びAUCが上昇したとの報告がある。	有機アニオントランスポーテーターを介したビタバスタチンの肝臓への取り込みを阻害すると考えられる。	血液・体液用薬 クロビドグレル硫酸塩	クロビドグレル硫酸塩の血小板阻害作用が増強されることにより、出血リスクが高まるおそれがある。クロビドグレル硫酸塩との併用は避けることが望ましい。	本剤のCYP2C19誘導作用により、クロビドグレル硫酸塩の活性代謝物の血漿中濃度が上昇すると考えられている。
循環器官用薬 ボセンタン水和物 トレプロスチニル	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	解毒剤 デフェラシロクス	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤のUGT誘導作用によるものと考えられている。
循環器官用薬 セレキシバグ	セレキシバグの活性代謝物のAUCが低下したとの報告がある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP2C8)誘導作用により、セレキシバグの活性代謝物の代謝が促進すると考えられている。	糖尿病用剤 カナグリフロジン水和物	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤のUGT1A9及びUGT2B4誘導作用によるものと考えられている。
気管支拡張剤 テオフィリン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	糖尿病用剤 その他CYP3A4等で代謝される経口糖尿病薬	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
消化器官用薬 5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗型制吐薬 オンダンセトロン 塩酸塩水和物 NK <sub>1</sub> 受容体拮抗型制吐薬 ホスアブレピタン トメグルミン セビメリソニド塩酸塩水和物	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、これらの薬剤又は活性代謝物の血中濃度を低下させると考えられている。	代謝性医薬品 ミコフェノール酸モフェチル シクロスボリン タクロリムス水和物 トファシチニブクエン酸塩 エリグレスタット酒石酸塩	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
副腎皮質ホルモン剤	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	代謝性医薬品 レフルノミド	外国人健康成人を対象に行なった併用試験において、レフルノミドの活性代謝物のCmaxが上昇したとの報告がある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、レフルノミドから活性代謝物への代謝を促進すると考えられている。
卵胞ホルモン・黄体ホルモン剤	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	抗悪性腫瘍製剤 CYP3A4等で代謝される薬剤 イリノテカシン塩酸塩水和物 タモキシフェンクエン酸塩 トレミフェンクエン酸塩 イマチチブメシリ酸塩 ゲフィチニブ ラバチニブトリセル酸塩水和物 レトロゾール エンザルタミド等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、これらの薬剤又は活性代謝物の血中濃度を低下させると考えられている。
泌尿生殖器官用薬 ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルデナフィルクエン酸塩 バルデナフィル塩酸塩水和物 タadalafil(シアリス、ザルティア)	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	抗悪性腫瘍製剤 ギルテリチニブマル酸塩	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤のCYP3A及びP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
泌尿生殖器官用薬 過活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフエナシン等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	抗悪性腫瘍製剤 ロミデプシン	ロミデプシンの血中濃度が上昇するおそれがある。	機序は不明である。
泌尿生殖器官用薬 過活動膀胱治療薬 ミラベグロン ビペグロン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)及びP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。	抗生物質製剤 クラリスロマイシン クロラムフェニコール ドキシサイクリン塩酸塩水和物	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
外皮用薬 ジアフェニルスルホン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、ジアフェニルスルホンの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	抗真菌剤 カスボファンギン酢酸塩	カスボファンギン酢酸塩との併用により、本剤単回投与ではカスボファンギンのAUCが上昇し、本剤の代謝誘導作用が定常状態下ではカスボファンギンのトラフ濃度が低下したとの報告がある。	トランスポーター(OATP1B1)を介した輸送過程が影響すると考えられている。
血液凝固阻止剤 クマリン系抗凝固薬	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。	抗結核薬 抗結核薬 イソニアジド等 [8.1 参照]	重篤な肝機能障害があらわれることがある。	本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用により、イソニアジドの代謝を促進し、肝毒性を有する代謝物の产生を増加させると考えられている。
血液凝固阻止剤 リバーロキサバン アピキサバン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)及びP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。	抗結核薬 エタンブトール塩酸塩	エタンブトール塩酸塩の視力障害を増強するおそれがある。 視力障害について観察を十分に行う。	機序は不明である。
血液凝固阻止剤 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	ダビガトランの血中濃度が低下することがある。	本剤のP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。			

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
合成抗菌剤 リネゾリド	外国人健康成人を対象に行った併用試験において、リネゾリドのCmax及びAUCが低下したとの報告がある。	機序は不明である。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 HIV プロテアーゼ阻害剤 (リトナビル、ロビナビル等) ネビラピン マラビロク エファビレンツ	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 ジドブジン	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤のUGT誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 ラルテグラビルカリウム	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤のUGT1A1誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 ドルテグラビルナトリウム	ドルテグラビルの血漿中濃度が低下したとの報告がある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)及びUGT1A1誘導作用によるものと考えられている。
抗ウイルス剤 HIV 感染症治療薬 エムトリシタビン・ テノホビル アラフェナミドフル酸塩	テノホビル アラフェナミドフル酸塩の作用が減弱することがある。	本剤のP糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。
化学療法剤 テルビナフィン塩酸塩 アゾール系抗真菌薬 フルコナゾール等	これらの薬剤の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
化学療法剤 アトバコン	アトバコンとの併用により、アトバコンの血中濃度が約53%低下し、 $t_{1/2}$ は約33時間短縮したとの報告がある。	機序は不明である。
天然麻薬 オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、オキシコドン塩酸塩水和物の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。
合成麻薬 メサドン塩酸塩	メサドン塩酸塩の作用が減弱することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素(CYP3A4等)誘導作用により、メサドン塩酸塩の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられている。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 効症肝炎等の重篤な肝機能障害（頻度不明）

[8.1 参照]

#### 11.1.2 ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）

初期症状：悪寒、顔面潮紅、呼吸困難等

#### 11.1.3 腎不全（頻度不明）、間質性腎炎（頻度不明）、ネフローゼ症候群（頻度不明）

#### 11.1.4 溶血性貧血（頻度不明）

#### 11.1.5 無顆粒球症（頻度不明）、血小板減少（頻度不明）

#### 11.1.6 偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（頻度不明）

症状：腹痛、頻回の下痢等

#### 11.1.7 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）、扁平苔癬型皮疹（頻度不明）、天疱瘡様及

び類天疱瘡様皮疹（頻度不明）、紅皮症（剥脱性皮膚炎）（頻度不明）

### 11.1.8 間質性肺炎（頻度不明）

### 11.2 その他の副作用

	5%以上	0.1~5%未満	頻度不明
肝臓		AST 上昇、ALT 上昇等	黄疸
過敏症		発疹等	発熱等のかぜ様症候群、荨麻疹等
腎臓		尿蛋白等	血尿等
血液			顆粒球減少、出血傾向、好酸球增多等
消化器	胃腸障害（食欲不振、恶心、嘔吐、胃痛、下痢、胃不快感等）		出血性びらん性胃炎
精神神経系		頭痛、めまい	不眠、いらいら感、傾眠、錯乱
内分泌			月経異常、甲状腺機能低下症、副腎機能不全
その他		しづれ感	全身倦怠感、筋脱力、手指のこわばり、浮腫、運動失調、尿・便等の着色 <sup>注)</sup>

注) 尿、便、唾液、痰、汗、涙液がリファンピシン及びその代謝物により橙赤色等に着色する。なお、血清も同様の着色を示す。また、ソフトコンタクトレンズが変色することもある。

### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

12.1 インドシアニングリーン (ICG) 排泄の遅延がみられることがある。

12.2 微生物学的検査法による血清中葉酸値、ビタミン B<sub>12</sub> 値が異常を示すことがある。

### 13. 過量投与

#### 13.1 症状

皮膚・唾液・涙液・汗・顔面の橙赤色化 (red man syndrome)、嘔気・嘔吐、腹痛、肝肥大、黄疸、AST・ALT等の上昇、頭痛、顔面又は眼窩周囲浮腫、急性肺水腫、嗜眠、意識障害、痙攣、低血圧、洞頻脈、心室性不整脈、心停止

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縫隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

### 15. その他の注意

#### 15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、ポルフィリン症の患者に投与した場合、症状を誘発又は悪化させたとの報告がある。

### 16. 薬物動態

#### 16.1 血中濃度

##### 16.1.1 単回投与

健康成人4例にリファンピシン450mgを朝食前30分に単回経口投与した場合の薬物動態パラメータは次のとおりであった<sup>4)</sup>。

単回経口投与におけるリファンピシンの薬物動態パラメータ

Tmax (hr)	1.90
Cmax ( $\mu$ g/mL)	7.99
T <sub>1/2</sub> (hr)	2.26

One compartment model

#### 16.3 分布

##### 16.3.1 組織分布

リファンピシンは、喀痰、肺・骨・腎等の各臓器、リンパ液及び脳脊髄液等の体液に広く分布する。また、乳汁、臍帶血及び羊水中へ移行することが認められている<sup>5)-8)</sup>。

### 16.3.2 蛋白結合率

リファンピシンの蛋白結合率は、平衡透析法でヒトアルブミンに対して 24.2~27.8%、プール血清に対して 22.2% であった<sup>9)</sup> (*in vitro*)。

### 16.4 代謝

健康成人にリファンピシン 450mg を経口投与した場合、尿中に検出される主な代謝物は、Desacetyl-rifampicin (DA-RFP)、3-Formyl-rifamycin SV 及び RFP-glucuronides 等であった<sup>10)、11)</sup>。DA-RFP は、リファンピシンより劣る抗菌力を示した<sup>12)</sup>。なお、リファンピシンは肝薬物代謝酵素チトクローム P450 (主に CYP3A4) を誘導する<sup>13)</sup>。

### 16.5 排泄

健康成人男性 1 例にリファンピシン 450mg を朝食前に単回経口投与した場合、投与後 24 時間までに糞便中に約 58%、尿中に約 30% が排泄された<sup>11)</sup>。また、胆汁中に排泄されたリファンピシン及び DA-RFP は腸肝循環することが認められた<sup>12)</sup>。

### 16.6 特定の背景を有する患者

#### 16.6.1 腎機能障害患者

腎機能障害患者 4 例にリファンピシン 300mg を単回経口投与した場合、投与後 1~2 時間で最高血中濃度 (5.1~6.8 μg/mL) に達し、T<sub>1/2</sub> は 3.85 時間であった。健康成人と顕著な差は認められなかつたが、投与後 12 時間までの平均尿中回収率は 3.1% と健康成人に比べて低かった<sup>14)</sup>。

#### 16.6.2 透析患者

慢性腎不全患者 3 例にリファンピシン 300mg を単回経口投与し、投与 3 時間後に透析を開始した場合、T<sub>1/2</sub> は 1.92~2.21 時間であり、健康成人と比べて短縮した<sup>14)</sup>。

#### 16.6.3 肝機能障害患者

肝硬変患者 13 例に 1 日リファンピシン 600mg を 7 日間毎日経口投与した場合、健康成人に比べ、血中濃度の上昇及び半減期の延長が認められた<sup>15)</sup> (外国人データ)。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 〈肺結核〉

#### 17.1.1 国内臨床試験

##### (1) 初回治療

- ・ 非空洞患者 221 例にリファンピシン・イソニアジドを 6 カ月間併用し、さらにイソニアジドを単独で 3 カ月間計 9 カ月間投与した場合、投与前排菌例 46 例は投与開始 2 カ月以内に全例菌陰性化 (培養) し、平均 1.5 年観察し得た 182 例の再排菌率は 1.1% (2/182 例) であった<sup>16)</sup>。
- ・ 主に空洞患者にリファンピシン・イソニアジド・ストレプトマイシンを 3 カ月間毎日併用し、さらにリファンピシン・イソニアジドを毎日、ストレプトマイシンを週 2 回併用した場合、6 カ月目の菌陰性化率 (培養) は 99% (97/98 例) であった。また、菌陰性化後 6 カ月間投与時及び 12 カ月間投与時の治療中止後 36 カ月までの再排菌率は、それぞれ 2.3% (3/128 例) 及び 0% (0/124 例) であった。主な副作用は、聴力低下、耳鳴り、めまいの合計がそれぞれ 6.3% (8/128 例)、7.3% (9/124 例) であった<sup>17)</sup>。
- ・ 主に菌陽性の空洞患者にリファンピシン・イソニアジドを毎日、ストレプトマイシンを週 2 回 (又はエタンブトールを毎日) 6 カ月間併用し、さらにリファンピシン・イソニアジドを 3 カ月間 (9 カ月投与群 76 例) 又は 6 カ月間 (12 カ月投与群 75 例) 每日併用した。9 カ月投与群では投与開始 3 カ月以内に、12 カ月投与群では 6 カ月以内に全例菌陰性化 (培養) した。また、両群の 36 カ月までの再排菌率は、1.3% (1/76 例) 及び 2.7% (2/75 例) であった。主な副作用は、好酸球增多でそれぞれ 34.2% (26/76 例)、33.3% (25/75 例) であった<sup>18)</sup>。

##### (2) 再治療

再治療患者を対象にしたリファンピシンと他の抗結核薬との併用群 (リファンピシン準単独投与) 121 例、リファンピシン・エタンブトール毎日投与群 67 例及びリファンピシン (週 2 回)・エタンブトール投与群 65 例の 6 カ月目の菌陰性化率 (培養) は、それぞれ 50.4% (53/105 例)、82.5% (47/57 例)、84.5% (49/58 例) であった。主な副作用は、胃腸症状でそれぞれ 13.3% (19/147 例)、18.6% (16/86 例)、3.9% (3/76 例) であった<sup>19)</sup>。これらのうち 3 年間追跡し得た患者の再排菌率は、それぞれ 31.3% (15/48 例)、10.0% (5/50 例)、7.8% (4/51 例) であった<sup>20)</sup>。

### 〈骨・関節結核〉

#### 17.1.2 国内臨床試験

難治性骨・関節結核患者 31 例にリファンピシン (300~450mg/日) をイソニアジド、パラアミノサリチル酸等いずれか 1~3 剤との併用で 6~12 カ月間毎日投与した場合、有効率は 67.7% (21/31 例) であった。1 例で AST、ALT の上昇があった<sup>21)</sup>。

#### 〈泌尿器結核及び性器結核〉

#### 17.1.3 国内臨床試験

未治療尿路結核患者 83 例にリファンピシン 450mg/日をイソニアジド (又はイソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム)、パラアミノサリチル酸と 2 年間以上毎日併用した場合の治癒率は、91.6% (76/83 例) であった。83 例中報告された副作用は 65.0% (54/83 例) で、主な副作用は、肝機能障害 19.3% (16/83 例)、血小板減少 13.3% (11/83 例)、胃腸症状 12.0% (10/83 例) であった<sup>22)</sup>。

#### 〈リンパ節結核〉

#### 17.1.4 国内臨床試験

リンパ節結核患者 29 例にリファンピシン 450mg/日をイソニアジド、エタンブトール等と 1~6 カ月間毎日併用した場合、観察し得た 37 個の腫大リンパ節に対する有効率は 94.6% (35/37 個) であった。29 例中報告された副作用は 20.7% (6/29 例) であった<sup>23)</sup>。

## 17.2 製造販売後調査等

#### 〈ハンセン病〉

ハンセン病患者を対象にした使用成績調査においてリファンピシンは本剤を含み 5 製剤使用された。有効性評価対象症例 116 例における有効率は 90.5% (105/116 例) であった。また、多菌型に対する有効率は 89.7% (96/107 例)、少菌型に対する有効率は 100% (7/7 例) であった。118 例中報告された副作用は 22.9% (27/118 例) で、主な副作用は胃不快感、嘔吐等の胃腸障害 5.1% (6/118 例) であった。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

リファンピシンは、放線菌 *Streptomyces mediterranei* から発見された Rifamycin の誘導体である<sup>24)</sup>。細菌の DNA 依存性 RNA ポリメラーゼに作用し、RNA 合成を阻害することにより抗菌作用を示すが、動物細胞の RNA ポリメラーゼは阻害しない<sup>25)</sup>。

### 18.2 抗菌力

18.2.1 分裂静止結核菌及び分裂増殖結核菌に対して殺菌作用を示し<sup>26)</sup>、ヒト型結核菌 H<sub>37</sub>Rv 株に対する最小発育阻止濃度 (MIC) は、Dubos 液体培地では 0.05 μg/mL、Kirchner 半流動培地では 0.1~0.25 μg/mL、1% 小川培地では 10 μg/mL である<sup>27)</sup> (*in vitro*)。

18.2.2 ヒト型結核菌黒野株によるマウス実験的結核症に対し、リファンピシン 10mg/kg の経口投与は、静脈内投与におけるストレプトマイシン 10mg/kg、イソニアジド 1mg/kg 投与よりも優れた治療効果を示した<sup>27)</sup>。H<sub>37</sub>Rv 株によるマウス実験的結核症に対してもリファンピシン 1mg/kg (皮下注) はストレプトマイシン 1mg/kg (皮下注) に優る治療成績を示した<sup>28)</sup>。またリファンピシンによって喀痰中の結核菌が培養陰性化した症例の空洞内結核菌に対しても作用し、早期かつ高率に培養陰性化することが認められている<sup>29)</sup>。

### 18.3 耐性

比較的高い頻度で耐性菌が出現することが認められている。しかし、他の抗結核薬との交叉耐性は認められていない<sup>27)</sup> (*in vitro*)。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

#### 一般的名称

リファンピシン (Rifampicin)

#### 化学名

(2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-methoxy-24,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-(4-methylpiperazin-1-yliminomethyl)-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-*b*]furan-21-yl acetate

#### 分子式

C<sub>43</sub>H<sub>58</sub>N<sub>4</sub>O<sub>12</sub>


#### 分子量

822.94

## 性状

橙赤色～赤褐色の結晶又は結晶性の粉末である。水、アセトニトリル、メタノール又はエタノール(95)に溶けにくい。

## 化学構造式



## 略号

RFP

## 20. 取扱い上の注意

アルミピロー開封後は湿気を避けて保存すること。

## 21. 承認条件

### 〈ハンセン病〉

ハンセン病については、WHOが現在実施中の多剤併用療法の大規模二重盲検比較臨床試験が終了し、結果が公表された時点で、効能・効果・用法・用量を見直す。

## 22. 包装

100カプセル [10カプセル(PTP) × 10]

## 23. 主要文献

- 1) 日本結核病学会非結核性抗酸菌症対策委員会：結核 2012；87 (2) : 83-86
- 2) 日本結核病学会非定型抗酸菌症対策委員会：結核 1998；73 (10) : 599-605
- 3) Griffith DE, et al. : Am J Respir Crit Care Med. 2007 ; 175 (4) : 367-416
- 4) 河野晴一ほか：臨床薬理 1982；13 (3) : 403-412
- 5) Furesz S, et al. : Arzneimittel-Forschung 1967;17 (5) : 534-537
- 6) 河盛勇造ほか：診療 1970；23 (S-6) : 996-1002
- 7) 柴田清人ほか：診療 1970；23 (S-6) : 1156-1160
- 8) 松田静治ほか：診療 1970；23 (S-6) : 1190-1195
- 9) 五味二郎ほか：診療 1970；23 (S-6) : 1047-1050
- 10) 佐野光司ほか：Jpn J Antibiot. 1970；23 (4) : 416-420
- 11) 中川英雄ほか：結核 1981；56 (12) : 577-586
- 12) 清水喜八郎ほか：診療 1970；23 (S-6) : 969-973
- 13) 千葉 寛：薬物動態 1995；10 (3) : 391-402
- 14) 木下康民ほか：診療 1970；23 (S-6) : 1056-1062
- 15) McConnell JB, et al. : Q J Med. 1981；50 (197) : 77-82
- 16) 岩崎龍郎ほか：結核 1980；55 (3) : 138-139
- 17) 長沢誠司：結核 1984；59 (2) : 81-89
- 18) 五味二郎ほか：結核 1985；60 (8) : 435-445
- 19) 五味二郎：結核 1970；45 (7) : 227-235
- 20) 五味二郎：結核 1974；49 (4) : 107-112
- 21) 大谷 清：結核 1973；48 (3) : 75-88
- 22) 仁平寛巳ほか：西日本泌尿器科 1976；38 (5) : 754-770
- 23) 青柳昭雄ほか：結核 1973；48 (8) : 351-356
- 24) 第十八改正日本薬局方解説書 2021 : C-6092-6102
- 25) Umezawa H, et al. : J Antibiot. 1968；21 (3) : 234-236
- 26) 金井興美ほか：結核 1979；54 (2) : 89-92
- 27) 山本和男ほか：診療 1970；23 (S-6) : 1292-1299
- 28) 副島林造ほか：診療 1970；23 (S-6) : 1076-1083
- 29) 亀田和彦ほか：結核 1975；50 (7) : 185-189

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室

〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号

TEL 0120-226-898

FAX 050-3535-8939

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売

## サンド株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1

URL:https://www.sandoz.jp/

### 26.2 販売

## NIPRO

ニプロ株式会社

大阪府摂津市千里丘新町3番26号