



リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「NP」の のみ方とご注意

このお薬は**毎週 1 回 1 錠**のむ
骨粗しょう症のお薬です。
(毎日のむお薬ではありません。)


のみ方

- **朝**、起きたとき（食事の前）に
1 錠をコップ 1 杯（約 180cc）
の**水道水**かぬるま湯でのんで
ください。
- このお薬をかんだり口の中で溶
かしたりしないでください。



のんだあとの注意

- のんでから **30 分間は水以外の
飲食はせず他のお薬ものまない**
でください。
- のんでから **30 分間は横になら
ない**でください。



のみ方についてご不明な点は、主治医または薬剤師におたずねください。

お薬の外観



のみ方

朝起きたら
食事の前に
1錠

コップ1杯の
水でかまずに

水以外の飲食や
横になるのは
30分後から

 リセドロン酸Na錠
17.5mg [NP]

のみ忘れた時

骨粗しょう症の薬

気づいた日の翌朝に1錠のんでください



B-1



(実物大)

のみ忘れた場合

- 気付いた日の翌朝に1錠をのんでください。
次からは、あらかじめ決められた曜日にのんでください。
- 同じ日に2錠をのまないでください。
- **歯医者さんで診察を受ける場合**は、必ずこの紙を見せてください。(歯科・歯科口腔外科の先生方へ：本剤はビスフォスフォネート系薬剤です)
- 胸やけなどを感じた場合には、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- その他気になる症状があらわれた場合も、主治医または薬剤師に相談してください。