

ロスバスタチン錠・OD錠「ニプロ」

を服用される患者さんへ



PTPシート(縮小80%)、錠剤(実物大)

このお薬について

ロスバスタチン錠・OD錠「ニプロ」は、余分なコレステロールの合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」が起ることが知られています。

服用しはじめてから次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医又は薬剤師にご相談ください。

- ☑ 筋肉が痛い
- ☑ 手足の力が入らない
- ☑ 尿の色が濃い(赤褐色になる) など

副作用はどのお薬でもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。

また、ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じられましたら、主治医又は薬剤師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう
「横紋筋融解症」とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し、尿が出にくくなる）になることもあります。

注意事項

- ☑ このお薬は、副作用として「肝炎、肝機能障害、黄疸」が起こることがあります。全身がだるい、吐き気がする、皮膚や白目が黄色くなる等の症状がみられましたら、主治医又は薬剤師に相談してください。
- ☑ OD錠は口に入れると溶けますが、その後は唾液またはコップ一杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。ただし、寝たままの状態では水またはぬるま湯なしで飲まないでください。
- ☑ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ☑ 間違えて多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- ☑ 主治医の指示なしに、ご自分の判断で飲むのを止めないでください。
- ☑ 乳幼児・小児の手の届かないところで、直射日光・高温・湿気を避けて保管してください。



施設名