

－適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

利尿降圧剤

処方箋医薬品^{注1)}

日本薬局方 フロセミド錠

フロセミド錠10mg「NP」

フロセミド錠20mg「NP」

フロセミド錠40mg「NP」

FUROSEMIDE TABLETS

2018年1月

ニプロ株式会社

注1) 注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を自主改訂により下記のとおり改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、添付文書の各項を十分ご覧くださいますようお願い申し上げます。

＜改訂のポイント＞

その他の副作用：「苔癬様皮疹」を追記

記

改訂後（_____下線：追加記載）	改訂前																
4. 副作用 2) その他の副作用 <table><tr><th>種類\頻度</th><th>頻度不明</th></tr><tr><td colspan="2">（省略）</td></tr><tr><td>皮膚^{注2)}</td><td>発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑、<u>苔癬様皮疹</u></td></tr><tr><td colspan="2">（省略）</td></tr></table>	種類\頻度	頻度不明	（省略）		皮膚 ^{注2)}	発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑、 <u>苔癬様皮疹</u>	（省略）		4. 副作用 2) その他の副作用 <table><tr><th>種類\頻度</th><th>頻度不明</th></tr><tr><td colspan="2">（省略）</td></tr><tr><td>皮膚^{注2)}</td><td>発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑</td></tr><tr><td colspan="2">（省略）</td></tr></table>	種類\頻度	頻度不明	（省略）		皮膚 ^{注2)}	発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑	（省略）	
種類\頻度	頻度不明																
（省略）																	
皮膚 ^{注2)}	発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑、 <u>苔癬様皮疹</u>																
（省略）																	
種類\頻度	頻度不明																
（省略）																	
皮膚 ^{注2)}	発疹、蕁麻疹、発赤、光線過敏症、そう痒症、水疱性皮膚炎、紫斑																
（省略）																	

【改訂の理由】

○「その他の副作用」の項

企業報告に基づき、「皮膚」の項に「苔癬様皮疹」を追記致しました。

以上

今後とも当社製品のご使用にあたって副作用等の有害事象をご経験の際には、当社MRまで、できるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

◎DSU（医薬品安全対策情報）No.266掲載（平成30年2月発行予定）

◎流通の関係上、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに日数を要することもございますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

◎改訂後の添付文書情報は当社ホームページ(<http://www.nipro.co.jp/>)に掲載しています。また医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)にも掲載されます。