

カムシア®配合錠「ニプロ」

を服用される患者さんへ

カムシア配合錠 LD「ニプロ」

カンデサルタン シレキセチル 8mg
アムロジピン 2.5mg



錠剤写真〈拡大150%〉



PTP写真〈実物大〉

カムシア配合錠 HD「ニプロ」

カンデサルタン シレキセチル 8mg
アムロジピン 5mg



錠剤写真〈拡大150%〉



PTP写真〈実物大〉

このお薬の作用

カンデサルタン

血圧を上昇させる物質の
働きを抑える

アムロジピン

血管を拡張する

2つの有効成分で血圧を下げるお薬です

お薬を服用される前に・・・

下記に当てはまる方は服用前に医師または
薬剤師に相談してください

- 以前お薬を服用して、発疹、かゆみなどのアレルギー症状が出たことのある方
- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
- 他のお薬（アリスキレンフマル酸塩）を服用している糖尿病の方

お薬を服用してから・・・

- 血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあります。
- このお薬を服用中は、高所作業、車の運転など危険を伴う機械を操作する際には十分注意してください。
- このお薬を服用する際は、グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。（血圧を下げる作用が強くなる場合があります。）
- その他気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。



施設名